

เมื่อถูกสุนัขกัด ข่วน เลียบาดแผล ต้องรีบ



ล้างแผล ด้วยสบู่และ
น้ำสะอาดอย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา เมตาดีน




กักหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน



หาหมอ เพื่อรับการป้องกัน
ที่ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

ถูกสุนัขกัด
ต้องล้างแผล ใส่ยา
กักหมา หาหมอ
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด



คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัขและแมว

- ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ทำหมัน อย่าให้มีลูกมากเกินไป
- เลี้ยงในรั้วบ้าน **ระวัง!** อย่าให้ไปกัดคนอื่น



**คาถา
5 ย**

กันสุนัขกัด

**อย่า
แหย่** ให้สุนัขโมโห

**อย่า
เหยียบ** หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ

**อย่า
แยก** สุนัขที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า

**อย่า
หยิบ** อาหารที่สุนัข
กำลังกิน

**อย่า
ยุ่ง** กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



045-969-952
phonkha61@hotmail.com
www.phonkha.go.th.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์นา




โรคพิษสุนัข บ้าอันตราย ถึง**ตาย** หากไม่ได้ ฉีดวัคซีน




โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส เป็นไดโนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



แต่ !!

สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ



กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน เลียบาดแผล แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน



การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด ข่วน เลียบาดแผล



ดูอย่างไร
ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก

นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด เก็บตัว หวาดระแวง

ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย กัดไม่เลือก เหา่หอน

ระยะอัมพาต

น้ำลายไหล คางห้อยตกลง มลง ตาย

ความรู้ที่มักเข้าใจผิด

❌ สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

✅ สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้

❌ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น

✅ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู

❌ โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว รักษาหายได้

✅ โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว "รักษาไม่หาย ตายทุกราย"